

7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés: A docetaxel prostata carcinomában prednisolonnal együtt alkalmazható: napi 10 (2x5) mg Prednisolone p.o. a kezelés megkezdésétől a 21. napig. A kezelés előtt 12 és 3 órával 8-8 mg dexamethason p.o. premedicáció szükséges. A protokoll 5 egymás utáni alkalmazása megengedett. Továbbiakban, 1 hét szünet után újabb 5 hetes ciklus indítható.

Diagnózisok :

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 71651 **Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]
TXT Docetaxel

Adagolás: 40.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	
Fázisok:	1	
TXT	Docetaxel	*

7184* Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Megjegyzés: Prostata carcinómában a docetaxel prednisolonnal együtt alkalmazható: napi 10 (2x5) mg Prednisolone p.o. a kezelés megkezdésétől a 21. napig. A kezelés előtt 12 és 3 órával 8-8 mg dexamethason p.o. premedicatio szükséges.

Diagnózisok :

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása :

Beavatkozás kód: 71841 **Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza :** 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75.0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*